

fungus from Southern Hemisphere plantations and natural forests. *Mycoscience* 52: 137-142.

Fukiharu, T. et al. (2013) *Coprinopsis novorugosobispora* sp. nov., an agaric ammonia fungus from Beijing, China. *Mycoscience* 54: 226-230.

Fukiharu, T. et al. (2014) *Coprinopsis asiaticiphlyctidospora* sp. nov., an agaric ammonia fungus from Amami and Okinawa, southern Japan. *Mycoscience* 55: 355-360.

吹春俊光他 (2014) 糞に生える菌類. 柿寫眞・徳増征二 (編), “菌類の生物学-分類・系統・生体・環境・利用-”, pp. 263-277. 共立出版, 東京.

Fukiharu, T. et al. (2015) *Coprinopsis igarashii* sp. nov., a coprophilous agaric fungus from Hokkaido, northern Japan. *Mycoscience* 56: 413-418.

本郷次雄 (1987) ヒトヨタケ科. In 今関六也・本郷次雄 (編), 原色日本新菌類図鑑 I. 保育社, 大阪.

Raut, J.K. et al. (2011) *Coprinopsis neophlyctidospora* sp. nov., a new ammonia fungus from boreal forests in Canada. *Mycotaxon* 115: 227-238.

Suzuki, A. et al. (2002) ITS rDNA variation of the *Coprinopsis phlyctidospora* (syn.: *Coprinus phlyctidosporus*) complex in the Northern and the Southern Hemispheres. *Mycoscience* 43: 229-238.

相良直彦 (1989) 『きのこ動物』築地書館, 東京.

※15 ページより続く

マツカサタケの意外な一面 続報

淵澤 功

写真1と2は、観察中のマツカサタケ (15 ページ写真5) の正面と裏側から、3月18日に撮影したものです。発生してから3か月

近く経ちますが、成長が非常に遅く、まだ成長途中のようで、どうも自然界の様子とは違うようです。



写真1




写真2